

MATHÉMATIQUES I

Durée : 4 heures

Options M, P, T, TA

I - Etude de suites

Pour un calcul célèbre Archimède considéra les relations de récurrence :

$$c_{n+1} = \sqrt{\frac{1+c_n}{2}} \quad \lambda_{n+1} = \frac{\lambda_n}{c_{n+1}}.$$

1°) Montrer que pour $c_1 = 0$ et $\lambda_1 = 2$ ces relations définissent effectivement deux suites $(c_n)_{n \geq 1}$, $(\lambda_n)_{n \geq 1}$ et qu'il existe deux autres suites $(\theta_n)_{n \geq 1}$ et $(\alpha_n)_{n \geq 1}$ telles que pour tout $n \geq 1$:

$$\theta_n \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] ; \quad \alpha_n \in \mathbb{R}_+ ; \quad c_n = \cos(\theta_n) ; \quad \lambda_n = \alpha_n \sin(\theta_n).$$

Montrer que la suite $(\lambda_n)_{n \geq 1}$ converge vers π .

2°) En utilisant une formule de Taylor montrer, pour tout $n \geq 1$, l'inégalité :

$$|\pi - \lambda_n| \leq \frac{\pi^3}{6 \times 4^n}.$$

En déduire un entier N_1 tel que $|\pi - \lambda_{N_1}| \leq 10^{-6}$.

3°) Montrer que pour tout entier naturel p donné, λ_n admet, lorsque n tend vers l'infini, le développement :

$$\lambda_n = \pi - \frac{\pi^3}{3!} \cdot \frac{1}{4^n} + \dots + (-1)^p \frac{\pi^{2p+1}}{(2p+1)!} \cdot \frac{1}{4^{pn}} + o\left(\frac{1}{4^{np}}\right).$$

4°) On définit une nouvelle suite $(\lambda_n^{(1)})_{n \geq 1}$ par $\lambda_n^{(1)} = \frac{-\lambda_n + 4\lambda_{n+1}}{3}$.

Montrer que cette nouvelle suite converge aussi vers π et que l'on a quand n tend vers l'infini

$$\lambda_n^{(1)} - \pi = o(\lambda_n - \pi).$$

Donner un équivalent de $\lambda_n^{(1)} - \pi$.

5°) Montrer qu'il existe un réel α (que l'on déterminera) tel que la suite $(\lambda_n^{(2)})$ définie pour

tout $n \geq 1$ par $\lambda_n^{(2)} = \alpha \lambda_n^{(1)} + (1-\alpha) \lambda_{n+1}^{(1)}$, vérifie

$$\lambda_n^{(2)} - \pi = o\left(\frac{1}{8^n}\right)$$

lorsque n tend vers l'infini.

6°) Donner $\lambda_n^{(2)}$ en fonction de λ_n , λ_{n+1} et λ_{n+2} et montrer l'inégalité pour tout n :

$$|\lambda_n^{(2)} - \pi| \leq \frac{17\pi^7}{576 \times 7!} \cdot \frac{1}{4^{3n}}.$$

Déterminer une valeur N_2 telle que l'on ait $|\lambda_{N_2}^{(2)} - \pi| \leq 10^{-6}$.

II - Polynômes de Bernoulli

1°) Soit f une fonction définie continue sur $[0,1]$, à valeurs réelles. Montrer que les conditions ci-dessous définissent une unique fonction F continûment dérivable sur $[0,1]$:

$$F' = f \quad \int_0^1 F(t) dt = 0$$

et exprimer F à l'aide de $G : x \mapsto \int_0^x f(t) dt$.

2°) Montrer que les conditions :

$$B_0 = 1, \quad B_{n+1}' = B_n \quad \text{et} \quad \int_0^1 B_{n+1}(t) dt = 0 \quad \text{pour tout } n \geq 0$$

définissent une unique suite de fonctions polynômes.

Préciser le degré de B_n et son terme de plus haut degré et expliciter les polynômes B_1, B_2, B_3 et B_4 .

3°) Montrer, pour tout n entier naturel supérieur ou égal à 2, l'égalité :

$$B_n(0) = B_n(1).$$

4°) On définit une suite de polynômes C_n en posant, pour tout n entier naturel :

$$C_n(X) = (-1)^n B_n(1-X).$$

Montrer que la suite (C_n) vérifie les conditions du 2°) définissant la suite (B_n) et en déduire que $(C_n) = (B_n)$.

Qu'en déduit-t-on pour les graphes des B_n et pour les valeurs, lorsque n est impair supérieur ou égal à 3, de $B_n(0), B_n(1/2)$ et $B_n(1)$?

5°) Montrer que les polynômes B_{2m+1} (pour $m \in \mathbb{N}$) ne s'annulent pas sur l'intervalle $]0, 1/2[$ (on pourra procéder par récurrence sur m et utiliser le théorème de Rolle).

En déduire que les polynômes $B_{2m}(X) - B_{2m}(0)$ sont de signes constants sur $[0,1]$.

III - Séries de Riemann et nombres de Bernoulli

1°) Montrer pour N entier naturel non nul :

$$\forall t \in]0, 1[\quad 1 + 2 \cdot \sum_{k=1}^N \cos(2k\pi t) = \frac{\sin((2N+1)\pi t)}{\sin(\pi t)}$$

2°) Montrer que pour tout entier $n > 0$, la fonction φ_n ci-dessous définie sur $]0, 1[$ est prolongeable par continuité à $[0, 1]$ et que le prolongement est continûment dérivable :

$$\forall t \in]0, 1[\quad \varphi_n(t) = \frac{B_n(t) - B_n(0)}{\sin(\pi t)}.$$

3°) Montrer que pour toute fonction f continûment dérivable sur $[0, 1]$ on a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(t) \sin(xt) dt = 0$$

(on pourra utiliser une intégration par parties).

4°) Pour k et n entiers strictement positifs, on définit :

$$I_{n,k} = \int_0^1 B_n(t) \cos(2k\pi t) dt.$$

Trouver une relation entre $I_{n,k}$ et $I_{n-2,k}$ et en déduire selon la parité de n , l'expression de $I_{n,k}$ en fonction de n et de k .

5°) En utilisant la formule établie au III 1°), trouver, pour N entier naturel, une expression de

$$\int_0^1 \varphi_{2m}(t) \sin(2N+1)\pi t dt$$

en fonction de m , N et $B_{2m}(0)$.

En déduire la valeur de $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{2m}}$ en fonction de m et de $B_{2m}(0)$.

Donner les valeurs de $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ et de $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4}$.

6°) Montrer, pour tout m entier naturel non nul, la majoration :

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{2m}} \leq 2$$

et en déduire la majoration $|B_{2m}(0)| \leq \frac{4}{(4\pi^2)^m}$.

Pour toute la suite du problème les fonctions considérées seront définies sur $[0,1]$ et indéfiniment dérivables.

IV - Formule sommatoire d'Euler

1°) Montrer pour m entier strictement supérieur à 0 (formule sommatoire à l'ordre m) :

$$\int_0^1 f(t) dt = \frac{f(0)+f(1)}{2} - \sum_{k=1}^m B_{2k}(0) \left[f^{(2k-1)}(1) - f^{(2k-1)}(0) \right] - \int_0^1 f^{(2m+1)}(t) B_{2m+1}(t) dt.$$

2°) Montrer, en utilisant II-5°), que pour tout m entier naturel, il existe c réel dans $[0,1]$ tel que

$$\int_0^1 f^{(2m+1)}(t) B_{2m+1}(t) dt = B_{2m+2}(0) f^{(2m+2)}(c).$$

En déduire une majoration de cette intégrale en fonction de $\|f^{(2m+2)}\|$, où

$$\|f^{(2m+2)}\| = \sup_{x \in [0,1]} |f^{(2m+2)}(x)|.$$

3°) Soit $0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 1$ une subdivision régulière de pas $h = \frac{1}{n}$ de l'intervalle $[0,1]$ (on a

donc $x_i = \frac{i}{n} = ih$, pour $i = 0, 1, \dots, n$).

Rappeler l'expression $T(h)$ obtenue par application de la méthode des trapèzes à la fonction f pour cette subdivision.

4°) Expliciter la formule sommatoire à l'ordre 2 pour les fonctions $f_i : t \mapsto f(x_i + ht)$ lorsque $i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$.

En déduire l'existence des réels a_1 et a_2 et d'une fonction r tels que

$$\int_0^1 f(t) dt = T(h) + a_1 h^2 + a_2 h^4 - r(h)$$

avec $|r(h)| \leq \|f^{(6)}\| \frac{h^6}{16\pi^6}$.

V - Accélération de Romberg

On reprend la méthode utilisée dans la partie I et on définit T_0 , T_1 , T_2 en posant :

$$\begin{aligned} T_0(h) &= T(h) \\ T_1(h) &= \frac{-T_0(h) + 4T_0\left(\frac{h}{2}\right)}{3} \\ T_2(h) &= \frac{-T_1(h) + 16T_1\left(\frac{h}{2}\right)}{15} \end{aligned}$$

1°) Montrer que pour $k = 0, 1$ ou 2 , on a :

$$T_k(h) - \int_0^1 f(t) dt = o(h^{2k+1})$$

lorsque h tend vers 0.

2°) Exprimer $T_2(h)$ en fonction de $\int_0^1 f(t) dt$ et de $r(h)$, $r\left(\frac{h}{2}\right)$ et $r\left(\frac{h}{4}\right)$.

En déduire la majoration :

$$\left| T_2(h) - \int_0^1 f(t) dt \right| \leq \frac{17}{9216} \cdot \frac{h^6}{\pi^6} \|f^{(6)}\|.$$

3°) On se propose d'appliquer la méthode décrite ci-dessus à la fonction $f : t \mapsto \frac{1}{1+t}$ de façon à

calculer une valeur approchée de $\ln 2 = \int_0^1 \frac{dt}{1+t}$.

a) Montrer que $\|f^{(6)}\| = 720$.

b) Quelle valeur de n faut-il prendre pour que $T_2(h)$ soit une approximation de $\ln 2$ à la précision de 10^{-12} ?

N.B. : on supposera les erreurs d'arrondi négligeables.