

EPREUVE SPECIFIQUE - FILIERE MP
 

---

**MATHEMATIQUES 2**

 Durée : 4 heures
 

---

Les calculatrices sont autorisées.

NB : Le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

**Introduction**

Dans tout ce problème, les espaces vectoriels seront des  $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels. On appelle **algèbre** tout  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel  $\mathbb{A}$  qui est muni d'une opération interne nommée multiplication ou produit. Cette multiplication est associative, et vérifie la propriété de distributivité :

$$\forall a \in \mathbb{A}, \forall b \in \mathbb{A}, \forall c \in \mathbb{A}, \quad a(b + c) = ab + ac, \quad (b + c)a = ba + ca$$

ainsi que :

$$\forall a \in \mathbb{A}, \forall b \in \mathbb{A}, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad a(\lambda b) = (\lambda a)b = \lambda(ab)$$

On suppose de plus qu'il existe un élément noté  $\mathbf{1}$  ou  $\mathbf{1}_{\mathbb{A}}$  et appelé élément neutre pour le produit, tel que :

$$\forall a \in \mathbb{A}, \quad a\mathbf{1} = \mathbf{1}a = a$$

Enfin si cette multiplication est commutative, l'algèbre est dite **commutative**. La **dimension** d'une algèbre est sa dimension en tant qu'espace vectoriel. Une **sous-algèbre** de  $\mathbb{A}$  est un sous-ensemble non vide de  $\mathbb{A}$  qui est lui-même une algèbre (pour les mêmes opérations) et qui possède le même élément neutre que  $\mathbb{A}$ . Pour que  $\mathbb{B}$  soit une sous-algèbre de  $\mathbb{A}$ , il suffit que ce soit un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{A}$ , qu'il contienne  $\mathbf{1}$  et que :

$$\forall b \in \mathbb{B}, \forall b' \in \mathbb{B}, \quad bb' \in \mathbb{B}$$

On appelle **morphisme d'algèbre** entre deux algèbres  $\mathbb{A}$  et  $\mathbb{B}$ , toute application linéaire  $f$  de  $\mathbb{A}$  dans  $\mathbb{B}$  qui vérifie en plus :

$$\forall a \in \mathbb{A}, \forall a' \in \mathbb{A}, \quad f(aa') = f(a)f(a') \quad \text{et} \quad f(\mathbf{1}_{\mathbb{A}}) = \mathbf{1}_{\mathbb{B}}$$

**Tournez la page S.V.P**

Un morphisme d'algèbre qui est une bijection est appelé **isomorphisme** d'algèbre. On vérifie alors que son application réciproque est également un morphisme d'algèbre. On dira que deux algèbres sont **isomorphes** s'il existe un isomorphisme d'algèbre entre les deux. Dans tout le problème,  $n$  désigne un entier strictement positif. Dans ce cas,  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  est l'espace vectoriel des matrices carrées à  $n$  lignes et  $n$  colonnes et à coefficients réels ; c'est une algèbre pour les opérations habituelles. L'élément neutre pour le produit est la matrice de l'identité, notée  $I_n$ . La **trace** d'une matrice  $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$  est :

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

C'est la somme des éléments diagonaux de la matrice  $A$ . Une matrice **scalaire** est une matrice de la forme  $\lambda I_n$ , où  $\lambda$  est un réel. Une matrice **diagonale** est une matrice dont les éléments non diagonaux sont tous nuls. L'ensemble des matrices scalaires et l'ensemble des matrices diagonales forment chacun une sous-algèbre de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

Ce problème étudie certaines propriétés des algèbres, et, en particulier, s'intéresse aux algèbres qui sont des corps, c'est-à-dire dans lesquelles tout élément non nul admet un inverse pour le produit.

## I. Étude d'un exemple

1. Soit  $A$  une matrice quelconque de  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ . Vérifier que :

$$A^2 - \text{tr}(A)A + \det(A)I_2 = 0$$

2. Soit  $A$  une matrice non scalaire ; on note  $\mathbb{A}$  l'ensemble

$$\mathbb{A} = \{M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid \exists (a, b) \in \mathbb{R}^2, M = aI_2 + bA\}$$

Vérifier que  $\mathbb{A}$  est une algèbre de dimension deux, sous-algèbre de  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ .

3. Montrer que  $\mathbb{A}$  contient une matrice  $B$  telle que

$$B^2 = -I_2 \text{ si, et seulement si, } (\text{tr } A)^2 < 4 \det A$$

4. Vérifier qu'alors  $I_2$  et  $B$  forment une base de  $\mathbb{A}$  et en déduire un isomorphisme d'algèbre entre  $\mathbb{A}$  et le corps  $\mathbb{C}$  des nombres complexes.
5. On suppose que  $A$  est non scalaire et vérifie :

$$(\text{tr } A)^2 = 4 \det A$$

Déterminer toutes les matrices de  $\mathbb{A}$  telles que  $M^2 = 0$ , et en déduire que  $\mathbb{A}$  n'est pas un corps.

6. Soit  $B$  une matrice non scalaire de  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ . On lui associe l'algèbre  $\mathbb{B}$  comme dans I.2. Démontrer que si  $A$  et  $B$  sont semblables,  $\mathbb{A}$  et  $\mathbb{B}$  sont des algèbres isomorphes.
7. On suppose que  $A$  est telle que :

$$(\text{tr } A)^2 > 4 \det A$$

Vérifier que  $A$  est diagonalisable de valeurs propres distinctes. En déduire que  $\mathbb{A}$  est isomorphe à l'algèbre des matrices diagonales. Est-ce que  $\mathbb{A}$  est un corps ?

## II. Quelques résultats généraux

Soit  $\mathbb{D}$  une algèbre de dimension finie  $n$ .

1. Soit  $a$  un élément de  $\mathbb{D}$ , démontrer que l'application  $\phi_a$  définie par :

$$\begin{aligned} \phi_a : \mathbb{D} &\longrightarrow \mathbb{D} \\ x &\longmapsto ax \end{aligned}$$

est un endomorphisme de l'espace vectoriel  $\mathbb{D}$ .

2. On note  $\mathcal{B}$  une base de  $\mathbb{D}$ .

$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\phi_a)$  désigne la matrice de l'endomorphisme  $\phi_a$  dans la base  $\mathcal{B}$ . Démontrer que l'application :

$$\begin{aligned} \Psi : \mathbb{D} &\longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \\ a &\longmapsto \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\phi_a) \end{aligned}$$

est un morphisme injectif d'algèbres. Vérifier que  $\Psi(\mathbb{D})$  est une sous-algèbre de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  et en déduire que  $\mathbb{D}$  est isomorphe à une sous-algèbre de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

3. On suppose que  $\mathbb{D} = \mathbb{C}$ , corps des nombres complexes. On munit  $\mathbb{C}$ , considéré comme  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, de la base  $\mathcal{B} = (1, i)$ . Pour tout nombre complexe  $z = a + ib$ , ( $a$  et  $b$  réels), écrire la matrice  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\phi_z)$ .
4. Soit maintenant  $\mathbb{A}$  une sous-algèbre de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . On s'intéresse à quelques cas où on peut affirmer que  $\mathbb{A}$  est, ou n'est pas, un corps.

- (a) On suppose que  $\mathbb{A}$  contient une matrice non scalaire  $A$  qui a une valeur propre réelle  $\lambda$ . Montrer que  $\mathbb{A}$  ne peut pas être un corps. On utilisera une matrice bien choisie, combinaison linéaire de  $I_n$  et de  $A$ .
- (b) En déduire que si  $\mathbb{A}$  contient une matrice diagonalisable ou trigonalisable non scalaire, elle ne peut pas être un corps.
- (c) On suppose que  $\mathbb{A}$  est **intègre**, c'est-à-dire que :

$$\forall A \in \mathbb{A}, \forall B \in \mathbb{A}, AB = 0 \Rightarrow A = 0 \text{ ou } B = 0$$

Montrer que, si  $A$  est une matrice non nulle de  $\mathbb{A}$ , l'application  $\phi_A : X \mapsto AX$  est un isomorphisme **de l'espace vectoriel**  $\mathbb{A}$ . En déduire que  $\mathbb{A}$  est un corps.

## III. L'algèbre des quaternions

On suppose qu'il existe deux matrices  $A$  et  $B$  de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telles que :

$$A^2 = -I_n, \quad B^2 = -I_n, \quad AB + BA = 0 \quad (*)$$

1. Démontrer que  $n$  ne peut pas être impair.
2. Démontrer que le sous-espace vectoriel  $\mathbb{H}$  engendré par les matrices  $I_n, A, B$  et  $AB$  est une sous-algèbre de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

3. Lorsque  $t, x, y$  et  $z$  sont des réels, calculer le produit :

$$(tI_n + xA + yB + zAB)(tI_n - xA - yB - zAB)$$

4. En déduire :

- (a) que les quatre matrices  $I_n, A, B$  et  $AB$  sont indépendantes et forment une base de  $\mathbb{H}$  ;
- (b) que  $\mathbb{H}$  est un corps.

5. On suppose **dans toute la suite du problème** que  $n = 4$  et, en notant  $J$  la matrice  $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  et  $0$  la matrice nulle de  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ , on définit les matrices  $A$  et  $B$  de  $\mathcal{M}_4(\mathbb{R})$  par :

$$A = \begin{pmatrix} J & 0 \\ 0 & -J \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -I_2 \\ I_2 & 0 \end{pmatrix}$$

On pose également  $C = AB$ .

- (a) Vérifier que les matrices  $A$  et  $B$  satisfont la condition (\*). On appellera donc  $\mathbb{H}$  le sous-espace vectoriel de  $\mathcal{M}_4(\mathbb{R})$  engendré par  $I_4, A, B$  et  $C = AB$ . Ses éléments sont appelés **quaternions**. La base  $(I_4, A, B, C)$  de  $\mathbb{H}$  sera notée  $\mathcal{B}$ .
- (b) Soit  $M$  une matrice non nulle de  $\mathbb{H}$ , vérifier que  ${}^tM \in \mathbb{H}$  ; quel lien y a-t-il entre  $M^{-1}$  et  ${}^tM$  ?

## IV. Les automorphismes de l'algèbre des quaternions

1. On appelle **quaternion pur** un élément  $M$  de  $\mathbb{H}$  tel que  $M = -{}^tM$ . Vérifier que l'ensemble des quaternions purs est un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension trois et de base  $\mathcal{C} = (A, B, C)$ . On le note  $\mathbb{L}$ . Est-ce une sous-algèbre de  $\mathbb{H}$  ?
2. On munit  $\mathbb{L}$  de la structure d'espace vectoriel euclidien telle que la base  $\mathcal{C}$  soit orthonormée. Le produit scalaire de deux éléments  $M$  et  $N$  de  $\mathbb{L}$  est noté  $(M|N)$ , la norme de  $M$  s'écrit  $\|M\|$ . Vérifier que :

$$\frac{1}{2}(MN + NM) = -(M|N)I_4$$

3. Montrer qu'un quaternion est pur si, et seulement si, son carré est une matrice scalaire de la forme  $\lambda I_4$  où  $\lambda$  est un réel négatif.
4. Soit  $\phi$  un isomorphisme d'algèbre de  $\mathbb{H}$  dans lui-même. Démontrer qu'il transforme tout quaternion pur en un quaternion pur de même norme, et que la restriction de  $\phi$  à  $\mathbb{L}$  est un endomorphisme orthogonal.
5. Soient  $M$  et  $N$  deux quaternions purs. On veut démontrer que si  $M$  et  $N$  ont même norme, alors il existe  $P \in \mathbb{H}$ , non nulle, telle que :

$$M = P^{-1}NP$$

- (a) Commencer par examiner le cas où  $M$  et  $N$  sont colinéaires.

(b) On suppose maintenant que  $M$  et  $N$  ne sont pas colinéaires. Vérifier que si  $M$  et  $N$  ont même norme :

$$M(MN) - (MN)N = \|M\|^2(M - N)$$

et en déduire une matrice  $P$  non nulle telle que  $MP = PN$ .

6. Montrer qu'alors, si on écrit  $P = \alpha I_4 + Q$ , avec  $\alpha$  réel et  $Q \in \mathbb{L}$ ,  $Q$  est orthogonal à  $M$  et à  $N$ .

7. En déduire que tout isomorphisme d'algèbre  $\phi$  de  $\mathbb{H}$  dans lui-même est défini par :

$$\phi(M) = P^{-1}MP$$

où  $P$  est un élément non nul de  $\mathbb{H}$ . On pourra observer qu'un tel isomorphisme est déterminé par l'image de  $A$  et de  $B$ , et commencer par chercher les isomorphismes qui laissent  $A$  invariante.

***Fin de l'énoncé.***