

MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT,
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

CONCOURS COMMUN 1996
ENTPE, ENSG, ENTM, ENSTIMD,

Banque de notes pour le concours EIVP

COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES PRATIQUES

Temps accordé : 2 heures

(2 pages)

Le plan affine euclidien est rapporté à un repère orthonormé direct $\mathcal{R}=(0; \vec{i}, \vec{j})$

On se propose d'étudier quelques propriétés de la courbe Γ (appelée spirale de Cornu), ensemble des points $M(t)$

dont les coordonnées dans \mathcal{R} sont $X(t)=\int_0^t \cos(u^2) du$, $Y(t)=\int_0^t \sin(u^2) du$ où t décrit \mathbb{R} .

I CONSTRUCTION DE Γ

I- 1 Montrer que les fonctions X et Y sont de classe \mathcal{C}^∞ sur \mathbb{R} .
Etudier la parité de X et de Y . Quelle symétrie présente Γ ?

I- 2 Montrer que les fonctions X et Y ont des limites finies lorsque t tend vers $+\infty$. Que peut-on en déduire pour la courbe Γ ?

On admettra que ces limites sont toutes deux égales à $\frac{\sqrt{2\pi}}{4}$ et on appellera K le point de

coordonnées $(\frac{\sqrt{2\pi}}{4}, \frac{\sqrt{2\pi}}{4})$.

I- 3 Etudier les variations de X et de Y . (Tableau de variations).

I- 4 On pose dans la suite, pour tout t appartenant à \mathbb{R} , $F(t) = \left(\int_t^{+\infty} \cos(u^2) du \right)^2 + \left(\int_t^{+\infty} \sin(u^2) du \right)^2$.
Donner une interprétation géométrique simple de $F(t)$.

Prouver que F est de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R}_+ et que, pour t appartenant à \mathbb{R}_+ , on a $F'(t) = -\int_0^{+\infty} \frac{\cos v}{\sqrt{v+t^2}} dv$.

I- 5 On fixe un nombre a strictement positif et on pose $I = \int_0^x \frac{\cos v}{\sqrt{a+v}} dv$.

a) Si f est une fonction continue et strictement décroissante sur $[0, \pi]$, montrer que $\int_0^\pi f(u) \cos u du$ est strictement positive.

b) Etudier la série de terme général $u_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\cos v}{\sqrt{a+v}} dv$ et en déduire que I est un réel strictement positif.

c) Que peut-on en conclure concernant la fonction F ?

I- 6 Employer une méthode analogue à celle qu'on a utilisée au 5°), pour déterminer le signe de $Y(t)$ pour tout t appartenant à \mathbf{R}_+^* . On admettra de même que $X(t)$ est strictement positif pour tout t appartenant à \mathbf{R}_+^* .

I-7 Γ admet-elle un point double ?

I- 8 Montrer que Γ a un unique point d'inflexion : le déterminer.

I- 9 Représenter la courbe Γ .

II ETUDE METRIQUE DE Γ

II-10 Déterminer une abscisse curviligne s sur Γ (on pourra choisir l'origine en O).

II-11 Déterminer le rayon de courbure R de Γ en un point $M(t)$.

II-12 On considère un arc birégulier : γ de classe \mathcal{C}^2 , et soit s une abscisse curviligne sur γ . On suppose qu'en tout

point M de γ d'abscisse curviligne s , le rayon de courbure R vérifie $R.s = \frac{1}{2}$.

a) Si φ désigne l'angle $(\vec{i}, \vec{\tau})$, où $\vec{\tau}$ est un vecteur unitaire de la tangente orientée à γ au point M de γ d'abscisse curviligne s , montrer que φ s'exprime en fonction de s par une relation du type : $\varphi = k + s^2$.

b) En déduire qu'il existe une transformation géométrique simple T telle que $T(\gamma) \subset \Gamma$.