

**A 2010 MATH I PC**

ÉCOLE DES PONTS PARISTECH.  
SUPAERO (ISAE), ENSTA PARISTECH,  
TELECOM PARISTECH, MINES PARISTECH  
MINES DE SAINT ÉTIENNE, MINES DE NANCY,  
TÉLÉCOM BRETAGNE, ENSAE PARISTECH (Filière PC).  
ÉCOLE POLYTECHNIQUE (Filière TSI).

CONCOURS 2010

**PREMIÈRE ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES**

**Filière PC**

**(Durée de l'épreuve : trois heures)**

**Sujet mis à la disposition des concours :**

**Cycle international, ENSTIM, TELECOM INT, TPE-EIVP.**

*Les candidats sont priés de mentionner de façon apparente  
sur la première page de la copie :*

*MATHÉMATIQUES I - PC*

*L'énoncé de cette épreuve comporte 6 pages de texte.*

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

## Théorème de la Limite Centrale.

---

### Notations

On introduit les trois espaces vectoriels sur  $\mathbb{R}$  de fonctions suivants

- $\mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ , l'espace des fonctions continues  $u$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  telles que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} u(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x).$$

On rappelle qu'une telle fonction  $u$  est nécessairement bornée sur  $\mathbb{R}$ .

- $\mathcal{C}_0^\infty(\mathbb{R})$ , l'espace des fonctions continues et de classe  $C^\infty$  (sur  $\mathbb{R}$ )  $u$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  telles que

$$\forall k \in \mathbb{N}, \lim_{x \rightarrow -\infty} u^{(k)}(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} u^{(k)}(x).$$

On a noté  $u^{(k)}$  la dérivée  $k$ -ième de  $u$ .

- $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ , l'espace des fonctions continues positives bornées de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  dont l'intégrale sur  $\mathbb{R}$  est égale à 1.

On munit  $\mathcal{C}_0(\mathbb{R})$  de la norme de la convergence uniforme  $\|\cdot\|_\infty$  : plus précisément, pour toute fonction  $u \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ , on pose

$$\|u\|_\infty = \sup_{x \in \mathbb{R}} |u(x)|.$$

On pourra utiliser librement le théorème de Fubini *admis* ci-dessous :

**Théorème 1.** (Fubini) Soit  $(x, y) \mapsto F(x, y)$  une fonction continue de  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $F$  vérifie les trois propriétés suivantes.

1] Pour tous réels  $x, y$ , les deux intégrales  $\int_{-\infty}^{+\infty} |F(v, y)| dv$  et  $\int_{-\infty}^{+\infty} |F(x, t)| dt$  convergent.

2] Les fonctions  $y \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} |F(x, y)| dx$ ,  $x \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} |F(x, y)| dy$ ,  $y \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} F(x, y) dx$ ,  $x \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} F(x, y) dy$  sont toutes continues sur  $\mathbb{R}$ .

3]  $y \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} |F(x, y)| dx$  est intégrable sur  $\mathbb{R}$ , c'est à dire que l'intégrale :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left( \int_{-\infty}^{+\infty} |F(x, y)| dx \right) dy$$

converge.

Alors dans ce cas,  $y \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} F(x, y) dx$  et  $x \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} F(x, y) dy$  sont intégrables sur  $\mathbb{R}$ , et leurs intégrales sur  $\mathbb{R}$  sont égales. Autrement dit, on peut intervertir les deux intégrales :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left( \int_{-\infty}^{+\infty} F(x, y) dx \right) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \left( \int_{-\infty}^{+\infty} F(x, y) dy \right) dx.$$

## I. Préliminaires

Pour  $f$  et  $g$  appartenant respectivement à  $\mathcal{P}(\mathbb{R})$  et  $\mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ , on définit le produit de convolution  $f * g$  par la formule

$$\forall x \in \mathbb{R}, f * g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(x-t)dt.$$

On définit  $f * g(x)$  par la même formule si  $f \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$  et  $g \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ .

**Q1** Soient  $f \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$  et  $g \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ . Montrer que l'intégrale  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(x-t)dt$  converge pour tout réel  $x$ . Puis montrer que  $f * g$  définit une fonction continue sur  $\mathbb{R}$ . (On pourra utiliser le théorème de continuité sous le signe  $\int$  et on vérifiera avec soin que les conditions de validité sont remplies). Vérifier de plus que

$$\forall x \in \mathbb{R}, f * g(x) = g * f(x).$$

**Q2** Montrer que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f * g(x) = 0$ . (On considèrera une suite réelle quelconque  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  tendant vers  $+\infty$ . On vérifiera avec soin qu'on peut appliquer le théorème de convergence dominée pour étudier  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f * g(x_n)$ ). Montrer de même que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f * g(x) = 0.$$

**Q3** Soient  $f$  et  $g$  appartenant à  $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ . Montrer alors que  $f * g$  définit une fonction de  $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ . Plus précisément, montrer que  $f * g$  définit une fonction continue sur  $\mathbb{R}$ , bornée, positive et d'intégrale égale à 1. (On appliquera le théorème de Fubini à la fonction  $(x, y) \mapsto f(y)g(x-y)$  et on pourra se contenter de ne vérifier que les conditions 1] et 3]).

Dans la suite on admettra et utilisera librement le résultat suivant. Si  $f$  et  $g$  appartiennent à  $\mathcal{P}(\mathbb{R})$  et  $u$  est une fonction de  $\mathcal{C}_0(\mathbb{R})$  alors,

$$f * (g * u) = (f * g) * u.$$

Soient  $f_1, \dots, f_n$  des fonctions de  $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ . On définit alors le produit de convolution  $f_1 * \dots * f_n$  par récurrence comme suit :

$$f_1 * \dots * f_k = (f_1 * \dots * f_{k-1}) * f_k, \forall k \in \{3, \dots, n\}.$$

Il est clair que  $f_1 * \dots * f_n$  est une fonction de  $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ .

Dans la suite, on notera  $f^{*n}$  la fonction  $f * \dots * f$ , la fonction  $f$  intervenant  $n$  fois.

## II. Une classe d'opérateurs sur $\mathcal{C}_0(\mathbb{R})$

Soit  $f$  une fonction de  $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ . On lui associe l'opérateur  $T_f$  agissant sur  $\mathcal{C}_0(\mathbb{R})$  défini pour tout  $u \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$  par

$$T_f(u) = f * u.$$

D'après **Q1** et **Q2**,  $T_f$  définit un endomorphisme de  $\mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ .

**Q4** Soit  $f$  une fonction de  $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ . Prouver que pour tout  $u \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ ,

$$\|T_f(u)\|_\infty \leq \|u\|_\infty.$$

**Q5** Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions de  $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ . Prouver que pour toute fonction  $u$  de  $\mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ ,

$$T_f T_g(u) = T_g T_f(u)$$

où  $T_f T_g$  désigne la composée des opérateurs  $T_f$  et  $T_g$ .

**Q6** Soient  $f_1, f_2, g_1, g_2$  des fonctions de  $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ . Prouver que pour tout  $u \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ ,

$$\|T_{f_1} T_{f_2}(u) - T_{g_1} T_{g_2}(u)\|_\infty \leq \|T_{f_1}(u) - T_{g_1}(u)\|_\infty + \|T_{f_2}(u) - T_{g_2}(u)\|_\infty$$

**Q7** Soient  $f$  et  $g$  des fonctions de  $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ . Prouver que si  $u \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ , alors pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,

$$\|(T_f)^n(u) - (T_g)^n(u)\|_\infty \leq n \|T_f(u) - T_g(u)\|_\infty.$$

### III. Loix normales

On introduit pour tout réel  $h > 0$ , la fonction

$$g_h(x) = \frac{1}{h\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2h^2}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

dite loi normale de paramètre  $h$ . On admet que  $g_1$  est une fonction de  $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ .

**Q8** Pour tout réel  $h > 0$ , montrer que  $g_h$  est une fonction de  $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ , puis calculer les deux intégrales suivantes :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x g_h(x) dx, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 g_h(x) dx.$$

Soient  $h_1 > 0$  et  $h_2 > 0$  deux réels strictement positifs. On admettra que :

$$g_{h_1} * g_{h_2} = g_h,$$

où  $h = \sqrt{h_1^2 + h_2^2}$ .

**Q9** Soit  $h > 0$ . Etablir les deux égalités suivantes entre opérateurs :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, T g_h = \left( T g_{\frac{h}{\sqrt{n}}} \right)^n = T \left( g_{\frac{h}{\sqrt{n}}} \right)^{*n}.$$

### IV. Convergence faible sur $\mathcal{P}(\mathbb{R})$

**Définition** : Soit  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de fonctions de  $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ . On dira que  $(f_n)$  converge faiblement vers  $f$ ,  $f$  étant une fonction de  $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ , si pour toute fonction  $u$  de  $\mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ ,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|T_{f_n}(u) - T_f(u)\|_\infty = 0.$$

Soit  $u$  une fonction de  $\mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ . On fixe un réel  $h > 0$  et on considère la fonction  $T_{g_h}(u) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  définie pour  $x$  réel par :

$$(g_h * u)(x) = T_{g_h}(u)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} g_h(t)u(x-t)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} g_h(x-t)u(t)dt,$$

où  $g_h$  a été défini au début de la partie III.

**Q10** Soit  $h$  strictement positif fixé et  $k \in \mathbb{N}$ . Démontrer qu'il existe un polynôme  $P_{k,h}$  dont on précisera le degré tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \left(\frac{d^k}{dx^k}g_h\right)(x) = P_{k,h}(x)e^{-\frac{x^2}{2h^2}}.$$

**Q11** Soient  $h, a \in \mathbb{R}^{+*}$  et  $k$  un entier positif ou nul. Prouver qu'il existe une fonction  $\phi_k : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty[$  continue par morceaux et intégrable sur  $\mathbb{R}$  telle que :

$$\forall x \in [-a, a], \forall t \in \mathbb{R}, |P_{k,h}(x-t)e^{-\frac{(x-t)^2}{2h^2}}| \leq \phi_k(t).$$

La fonction  $\phi_k$  ne dépend que de  $h, a$  et  $k$ . (On pourra majorer  $|P_{k,h}(x-t)e^{-\frac{(x-t)^2}{4h^2}}|$  indépendamment de  $(x-t)$ . Ensuite on pourra majorer convenablement  $e^{-\frac{(x-t)^2}{4h^2}}$  pour  $|t| \geq 2a$  et  $x \in [-a, a]$ ).

**Q12** Soient  $h$  strictement positif fixé et  $u \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ . Démontrer que  $T_{g_h}(u)$  est une fonction de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}$ . Puis montrer que  $T_{g_h}(u)$  est de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Q13** Pour  $h$  strictement positif fixé et  $u \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ , démontrer que  $T_{g_h}(u)$  est une fonction de  $\mathcal{C}_0^\infty(\mathbb{R})$ .

**Q14** Soit  $\alpha$  un réel strictement positif. Déterminer  $\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{-\alpha} g_h(t)dt$  et  $\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_{\alpha}^{+\infty} g_h(t)dt$ .

**Q15** Soit  $u \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ . Prouver que

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \|T_{g_h}(u) - u\|_\infty = 0.$$

Pour cela on utilisera la question précédente ainsi que le résultat admis suivant, valable pour tout  $u \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$  :

$$\forall \epsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x, y \in \mathbb{R}, |x - y| \leq \alpha \Rightarrow |u(x) - u(y)| \leq \epsilon.$$

**Q16** Soit  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de fonctions de  $\mathcal{P}(\mathbb{R})$  et  $f$  une fonction de  $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ . On suppose que pour toute fonction  $u$  de  $\mathcal{C}_0^\infty(\mathbb{R})$ ,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|T_{f_n}(u) - T_f(u)\|_\infty = 0.$$

Prouver alors que  $(f_n)$  converge faiblement vers  $f$ . (On pourra utiliser les questions 4 et 15).

Dans la suite,  $f$  est une fonction de  $\mathcal{P}(\mathbb{R})$  telle que  $x \rightarrow x^2 f(x)$  est aussi dans  $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ . On admet que l'intégrale  $\int_{-\infty}^{+\infty} t f(t) dt$  converge et on supposera que  $\int_{-\infty}^{+\infty} t f(t) dt = 0$ . Pour tout  $n$  entier strictement positif, on introduit les deux fonctions  $f_n$  et  $f_n^\#$  définies par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f_n(x) = \sqrt{n} f(\sqrt{n} x), f_n^\#(x) = n x^2 f_n(x).$$

On admettra que  $f_n$  et  $f_n^\#$  appartiennent à  $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ .

**Q17** Soit  $x \in \mathbb{R}$  et  $u \in \mathcal{C}_0^\infty(\mathbb{R})$ . Vérifier que  $t \rightarrow \frac{u(x-t) - u(x) + t u'(x)}{t^2}$  se prolonge continûment en  $t = 0$ . Puis montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  on a :

$$n \left( T_{f_n}(u)(x) - u(x) \right) - \frac{1}{2} u''(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left( \frac{u(x-t) - u(x) + t u'(x)}{t^2} - \frac{1}{2} u''(x) \right) f_n^\#(t) dt,$$

où  $u'$  désigne la dérivée première de  $u$  et  $u''$  désigne la dérivée seconde de  $u$ .

**Q18** Démontrer que pour toute fonction  $u$  de  $\mathcal{C}_0^\infty(\mathbb{R})$ ,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left\| n \left( T_{f_n}(u) - u \right) - \frac{1}{2} u'' \right\|_\infty = 0.$$

(On pourra considérer les trois intégrales  $\int_{-\infty}^{-\alpha}$ ,  $\int_{-\alpha}^{\alpha}$  et  $\int_{\alpha}^{+\infty}$ , avec  $\alpha > 0$  bien choisi, dans le second membre de la formule de la question précédente).

**Q19** Montrer que pour toute fonction  $u$  de  $\mathcal{C}_0^\infty(\mathbb{R})$ ,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \| T_{f_n}^n(u) - T_{g_1}(u) \|_\infty = 0,$$

où  $g_1$  a été définie au début de la partie III. (On pourra utiliser les questions 7, 9 et 18). Conclure que la suite  $(f_n^{*n})$  converge faiblement vers  $g_1$ ; on rappelle que la notation  $f^{*n}$  a été définie juste après la question 3.

### FIN DU PROBLÈME.

Ce dernier résultat intervient en théorie des probabilités. Il constitue une version faible du théorème de la limite centrale dans le cas de variables aléatoires à densité de probabilité  $f$  continue bornée sur  $\mathbb{R}$ .